



AspFarmInforma

(Appropriatezza Prescrittiva In Pratica)

AWaRe
WATCH

Fluorochinoloni

Levofloxacină · Ciprofloxacina · Moxifloxacină · Norfloxacina · Prulifloxacină · Rufloxacina
ATC: J01MA · Categoria AWaRe: WATCH

I Fluorochinoloni sono stati classificati come Watch dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Dovrebbero essere utilizzati solo in caso di infezioni resistenti, per il contenimento e il contrasto all'antibiotico-resistenza. La classificazione degli antibiotici utilizzata fa riferimento a quella del manuale AWaRe, che identifica tre gruppi:

Classificazione AWaRe – OMS →

https://www.oif.gov.it/documents/20142/1811463/Manuale_antibiotici_Aware.pdf

● ACCESS

Opzione di trattamento empirico di prima/seconda scelta per le infezioni comuni. Spettro di attività ristretto, basso costo, buon profilo di sicurezza, potenziale di resistenza generalmente basso.

● WATCH

Antibiotici ad ampio spettro, generalmente più costosi. Raccomandati solo come opzione di prima scelta per pazienti con manifestazioni cliniche più gravi o per infezioni in cui è più probabile che i patogeni siano resistenti agli ACCESS, come le infezioni delle alte vie urinarie (IVU). Sono antibiotici soggetti a programmi di stewardship e monitoraggio.

● RESERVE

Antibiotici di ultima scelta usati per trattare le infezioni multifarmaco - resistenti.

⚠ PAZIENTI A RISCHIO

Le raccomandazioni prevedono di prescrivere questi medicinali con **particolare cautela** nei pazienti a maggiore rischio di tendinite e rottura del tendine:

Categoria paziente	Rischio specifico
Anziani	Maggiore rischio di tendinite e rottura del tendine
Pazienti con compromissione renale	Ridotta eliminazione del farmaco → accumulo e tossicità aumentata
Pazienti sottoposti a trapianto di organi solidi	Aumentata suscettibilità a tendinopatie e danni muscolo-scheletrici

CAUTELA

📄 ANTIBIOTICI FLUOROCHINOLONICI AD USO SISTEMICO ED INALATORIO: RICHIAMO ALLE LIMITAZIONI D'USO

In data 8 giugno 2023 l'AIFA ha pubblicato una Nota informativa importante concordata con le Autorità Regolatorie Europee consultabile al link →

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1804929/2023.06.08_NII_Antibiotici-Fluorochinolonici_IT.pdf

🔗 INTERAZIONI PERICOLOSE

Non associare con	Rischio
Corticosteroidi	🦵 Rottura tendine di Achille (specie over 65) ⚠️ NON prescrivere fluorochinoloni a pazienti già in terapia con corticosteroidi
Statine	👉 Aumento rischio effetti collaterali muscoloscheletrici
Macrolidi + Antipsicotici	⚡ Prolungamento intervallo QT · Rischio aritmie ventricolari

🚨 INVITO ALLA SEGNALAZIONE

⚠️ La **segnalazione delle reazioni avverse sospette** (ADRS) che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è **importante**, in quanto permette un **monitoraggio continuo** del rapporto beneficio/rischio del medicinale.

Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il Sistema Nazionale di segnalazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Sito web: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Le segnalazioni di Sospetta Reazione Avversa da Farmaci devono essere inviate al **Responsabile di Farmacovigilanza** della Struttura di appartenenza dell'Operatore stesso.

Data ultima modifica 09.04.2026

Il presente documento fornisce indicazioni sugli aspetti farmacologici e di sicurezza riguardanti il farmaco. Per ulteriori informazioni e approfondimenti fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.