



AspFarmInforma

(Appropriatezza Prescrittiva In Pratica)

SCHEDA PRESCRITTIVA · LIMITAZIONI PER ETA'



Controindicazioni in Eta' Pediatrica

Tabella esemplificativa e non esaustiva · Fonte: schede tecniche e Note Informative AIFA

CONTROINDICATO

NON RACCOMANDATO

SI (con limitazioni)

TABELLA CONTROINDICAZIONI PER PRINCIPIO ATTIVO

Principio Attivo	Controindicazione
Acido Tiaprofenico	CONTROINDICATO < 3 anni
Etoricoxib, Meloxicam, Ketorolac	CONTROINDICATO < 16 anni
Dexibuprofene, Aceclofenac	NON RACCOMANDATO < 18 anni
Diclofenac, Indometacina, Nabumetone	CONTROINDICATO < 14 anni
Flurbiprofene	NON RACCOMANDATO < 12 anni
Tenoxicam	NON RACCOMANDATO < 15 anni
Ibuprofene	SI con specifiche in base alle diverse formulazioni Cpr/Bst: CONTROINDICATO < 12 anni Sciroppo: CONTROINDICATO < 3 mesi e peso < 5,6 kg Supposte: CONTROINDICATO < 2 anni e peso < 12,5 kg Fiale i.m.: CONTROINDICATO < 14 anni
Ketoprofene Bst 80 mg Ketoprofene 160 mg/2ml sol. iniet.	CONTROINDICATO < 6 anni CONTROINDICATO < 15 anni
Naprossene	CONTROINDICATO < 2 anni
Nimesulide	CONTROINDICATO < 12 anni
Acido Niflumico	CONTROINDICATO < 6 mesi
*1 Salbutamolo 5 mg/ml sol. nebulizzare (Nota Informativa AIFA 18.11.2024)	NON UTILIZZARE < 2 anni
*2 Salbutamolo + Ipratropio Bromuro (BREVA) sol. nebulizzare (Nota Informativa AIFA 05.07.2023)	NON UTILIZZARE < 18 anni (AIFA 2023 - off-label e non mutuabile)
Fluorochinoloni	CONTROINDICATI nei bambini e negli adolescenti durante la crescita (NOTA AIFA FLUOROCHINOLONI a causa di sospette ADR a carico delle cartilagini di accrescimento e di artropatie) - L'unico fluorochinolone autorizzato nei bambini e adolescenti è la CIPROFLOXACINA secondo le indicazioni riportate in RCP

Tacrolimus topico 0,1%	NON UTILIZZARE < 16 anni Sotto i 16 anni è off-label e deve essere utilizzato Tracolumus unguento - usare 0.03% dai 2 anni
Codeina/Paracetamolo	CONTROINDICATO < 12 anni
Olanzapina, Paliperidone, Quetiapina	CONTROINDICATO < 18 anni
Clozapina	CONTROINDICATO < 16 anni
Aripiprazolo	CONTROINDICATO < 15 anni

■ *1 NOTA AIFA 2024 - SALBUTAMOLO 5 MG →

<https://www.aifa.gov.it/-/nuove-importanti-informazioni-di-sicurezza-su-broncovaleas-salbutamolo->

■ *2 NOTA AIFA 2023 - SALBUTAMOLO + IPRATROPIO BROMURO (BREVA) →

<https://www.aifa.gov.it/-/modifica-di-indicazioni-e-popolazione-autorizzata-dei-medicinali-a-base-dell-associati-one-fissa-fdc>

■ FANS IN ETA' PEDIATRICA - RACCOMANDAZIONI AIFA

L'AIFA ha rilevato un progressivo incremento di sospette ADR a carico della cute e del sistema GI nell'uso dei FANS in pediatria, spesso associati al paracetamolo.

- Il paracetamolo e l'ibuprofene sono gli unici antipiretici raccomandati in età pediatrica
- L'uso combinato o alternato di ibuprofene e paracetamolo NON è raccomandato rispetto alla terapia con un singolo farmaco (scarse evidenze su sicurezza ed efficacia)

Data ultima modifica 31.03.2026

Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia - UOC Farmaceutica Territoriale

Via F. Protetti Pal. Rosano Piano Terra - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel. 0963 962938 - Mail: farmterr@aspvv.it